



Basilikum - *Ocimum basilicum*

Oprindelse og anvendelse

Basilikum er en etårig plante, som hører til læbeblomstfamilien (*Labiatae*). Den har ca. 30 cm høje, grenede stængler, grønne blade og små hvide eller svagt røde blomster, der springer ud i juli-august. I Danmark dyrkes den som krydderurt.

Basilikum vokser vildt i Asien, men allerede for godt 2000 år blev den indført til Grækenland. I dag findes den vildtvoksende flere steder i Sydeuropa, og den er en uundværlig krydderurt i madkulturerne omkring Middelhavet.

Basilikum er siden oldtiden kendt som lægeplante og den er ligeledes fundet i gravkamre i pyramiderne. Romerne brugte den som urindrivende og afførende middel, ligesom den i store doser tillige skulle øge elskovslysten. I dag anvendes den hovedsagligt som krydderurt.

Dyrkningsvejledning

Det danske klima er bestemt nordgrænsen for planten. Basilikum foretrækker en varm vokseplads og kan ikke tåle at få det for tørt.

Jordtype

Basilikum kræver en ensartet og næringsrig jord med en god vandkapacitet. Arealet skal være fri for flerårigt ukrudt og have et lavt ukrudtstryk. Gode læforhold og en lun jord er at foretrække.

Såning

Basilikum er en varmekrævende plante, hvorfor der inden såning med fordel kan benyttes et til to falske såbede. Den optimale C og frøene sås derfor først i slutning af maj°spiretemperatur er 18-20 begyndelsen af juni måned. Der udsås ca. 2-3 kg frø pr. ha ved en række afstand på 40-50 cm. Såbedet kan med fordel tildækkes med fiberduk. Den bedste fremspiring fås ved en sådybde på 2-5 mm.

Gødskning

Ved tilberedelsen af såbedet tilføres 40-60 kg N, 60- 80 kg P, samt 120-140 kg K pr. ha. Efter første slæt tilføres i forbindelse med vanding yderligere 60-70 kg N pr. ha.

Basilikum er god til at udnytte en evt. eftervirkning fra organisk gødning.

Ukrudtsbekæmpelse

Umiddelbart inden fremspiring kan fortages en bekæmpelse med 1 l Round Up pr. ha. Under normale forhold spirer frøene i løbet af 10-14 dage. Renholdelse skal herefter ske ved radrensning og lugning.

Vanding

I perioden mellem såning og fremspiring bør vanding undgås. Ellers vandes efter behov med 20-25 mm pr. gang.

Sygdomme og skadedyr

Basilikum kan være inficeret med nældesilke, som er en snylteplante med gule tynde stængler. Tillige kan basilikum ved tæt plantebestand have risiko for angreb af gråskimmel.

Høst

Første slæt tages ved begyndende blomstring. Stubhøjden bør være 10-15 cm. Nye skud vil påbegynde blomstring igen i september, og afhængig af vækstsæsonen kan der opnås endnu et slæt.