



## Canadisk Blodahorn – 'acer rubrum'

Klargøring af frø:

Frøene lægges i lunkent vand i 24 timer. Fyld en lille potte med en blanding af såjord og sand i forholdet 2:1 - frøene dækkes med ca 0,5 cm af blandingen. Blandingen fugtes. Sæt potten i en plasticpose og luk den helt tæt til. Sæt posen i køleskabet i 30 dage (=stratificering)

Efter denne periode tages posen ud af køleskabet. fjern posen og placér potten lyst 20-25° hvis det er nødvendigt fugtes jorden igen og den dækkes herefter med klar film, der laves lufthuller med en tandstik el. lign.

Jorden holdes fugtig men ikke våd. Fjern filmen en times tid hver dag for at undgå skimmeldannelse.

Alternativt kan man plante frøene ud i potter i efteråret, men faren herved er dog at hvis de spirer, kan en omgang hård frost slå de små kimplanter ihjel.

Spiringen tager mellem 6-8 uger. Når planterne er ca. 3 cm skal de prikles ud i hver sin potte. Vær forsigtig så rødderne ikke beskadiges. Plant i en blanding af jord og sand (2:1)

Vækst:

Træet kræver ikke nogen specifikke krav til havejorden, det "bryder sig ikke om" for fugtig og for kalkholdig jord.

Placeringen bør være solrig eller halvskygge. Ved hedebløge bør vandes godt, men undgå at træet sopper i vand. Fra april til september gødes let.

Hurtigvoksende og Hårdfør ned til -40°