



Sommerblomster – Generelt

For de fleste sommerblomster, 1 og 2 årige gælder det at de kan forkultiveres inde fra februar-april eller sås direkte på voksestedet fra marts til maj.

Meget hårde frø – f.eks. Lathyrus (Ærteblomster), Pragtsnerler osv. Kan med fordel lægges i blød i lunkent vand i 24-48 timer før såning, dette vil fremme spiring

Frøene skal sås i en dybde der svarer til frøets størrelse på den korteste led x 2.

Ved forkultivering inde er det vigtigt at der er masser af lys, da man ellers får lange tynde ranglede svage planter. Det kan være en fordel at så mange frø i bakker, og så prikke dem ud enkeltvis efterfølgende - Dette gøres når planterne har fået de første blivende blade, eller når de er store nok til at man kan håndtere dem uden at beskadige dem.

Ved at fjerne blomsterne når de visner, fremmer man blomstringen. Sidst på sommeren kan man vælge at lade blomsterne visne og danne frøstande. Disse kan så efterfølgende tørres og frøene sås det kommende år. Frøene skal opbevares mørkt og køligt og kan herved bevare spireevnen i et par år eller mere.

De etårige vil som regel blomstre langt hen i efteråret.

For de 2 åriges vedkommende, kan man med fordel så dem i efteråret, for så at få en tidlig blomstring det efterfølgende år.

Mange af disse vil selvså flittigt hvis de får lov.

Har du spørgsmål til en konkret art, så send mig endelig en mail!